

# CAMPYLOBACTER

**Agente Etiológico:**  
*Campylobacter jejuni*



## ¿QUÉ ES?

- Enfermedad infecciosa diarreica.
- Patógeno más frecuente que la Salmonelosis.
- Responsable de brotes de Enteritis bacteriana aguda.
- Agente causal de la campilobacteriosis.

## MORFOLOGÍA

- Bacilos **Gramnegativos**.
- **Sensibles al calor y a pH bajos**
- Tienen forma de "COMA" ó "HÉLICE".
- Flagelo polar en uno o en ambos extremos.
- Movimiento en espiral.
- Anaerobio Facultativo (requiere de bajos niveles de oxígeno para crecer).

## EPIDEMIOLOGÍA

- Transmitido por; Alimentos crudos o mal cocinados.
- Tiene un pico de incidencia en los meses de verano.
- Se produce más en jóvenes-adultos y en lactantes

## SINTOMATOLOGÍAS

- Dolor abdominal tipo cólico, más severa que la salmonelosis.
- Malestar general.
- Fiebre.
- Vómito.
- **Otros clínicos no tan frecuentes:** meningitis, síndrome similar a la F. Tifoidea, artritis.

**Periodo de incubación:** de 2 a 5 días.

**Prevención:** evitar consumir alimentos de origen animal poco cocinados o sin pasteurizar, especialmente la leche y la carne de aves cruda.

**Tratamiento:** Beber de 8 a 10 vasos de líquidos por día.  
Consumir: Comidas pequeñas durante el día. Alimentos salados.  
Alimentos ricos en potasio.